

様

令和3年用 水稲肥料農薬 予約申込書



JA津安芸

肥料・農薬は全量予約で
コストを引き下げよう!!



令和3年用水稲肥料農薬予約申込書（提出用）は
P27にあります。

※予約価格には『引取り』と『配達』の2種類があります
ので記入欄をお間違いのないようにご注意ください!!
安価な『引取り』でのご注文をお奨めいたします。

目次

●肥料農薬年間特約運動について…………… 1	●チラシの折込み（肥料）…………… 6～10	●チラシの折込み（農薬）…………… 13～24
●予約申込みに関するお願い…………… 1	●初中期一発除草剤の効くしくみ・	（カメムシの特徴と被害の発生しやすい条件……23）
●雑草イネ対策こよみ…………… 2	水稻除草剤使用8ヶ条・	●水稻肥料農薬予約価格表・摘要……25～26
●ジャンボタニシ対策こよみ…………… 3～4	「安全・安心な農産物づくり」のために	●水稻肥料農薬申込書（提出用）……………27
●白未熟粒の軽減対策…………… 5	……………11～12	●水稻肥料農薬申込書（お客様控）……………28

肥料農薬年間特約運動について

平素は、JA津安芸の事業に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

本年も、令和3年産米づくりに向け『水稻肥料農薬』の予約注文時期となりました。

当JA津安芸では、予約注文により肥料・農薬をお求めやすい価格で提供できるように取り組んでおりますので、是非ともこの機会に予約注文にて肥料・農薬のご購入をよろしくお願い申し上げます。また、農家コスト低減の取り組みとして『農家引取り価格』の設定に加えて、高品質・低価格商品であります『全農銘柄集約商品』も記載しておりますので、ご活用をいただきますようお願いいたします。

◎ 良質米生産のポイント

1. 健苗育成と適期移植
2. 適正な元肥、穂肥の施用
3. いもち病、紋枯病、カメムシ防除の徹底
4. 早期落水の防止（収穫7日前まで土壌水分を維持）
5. 適期刈取り（収穫期は出穂からおよそ35～40日）
6. 適正な乾燥調整を
 - （1）乾燥速度は1時間に0.8%以下、目標は玄米水分14.5～15.0%
 - （2）米選機のふるい目は1.85mm以上とし、流量は少なめ
7. リンスターケイカル等の土づくり資材の施用

令和3年用肥料農薬予約申込みに関するお願い

- 予約注文については『配達』と『引取り』の2種類がありますので記入欄の間違ひのないようご注意ください。
- 農家引取り日・引取り場所については各営農センターよりご連絡させていただきます。農家引取り日の当日は来店時間帯によって多少混雑する場合がありますのでご了承ください。
- 配達の商品は農家引取り日以降に順次配達をさせていただきますがお急ぎの商品等があれば営農センターへご相談をください。
- 注文書記載商品以外の肥料・農薬を希望される方は、注文書の空欄に記入してください。（予約扱い）※毒物及び劇物商品をご注文いただいた場合は、印鑑が必要になります。
- 農薬について、予約価格表・摘要の頁（P26）で網掛けをしてある商品については経済的な大型規格品もご用意してあります。規格・価格等については、各営農センターへお問い合わせください。
- 代金決済は令和3年9月15日（水）に口座振替にて頂戴させていただきます。
- ご購入いただきました商品合計金額（税込）に応じて決済時に別途値引きさせていただきます。




詳細・ご不明な点などにつきましては
各営農センターまたは本店購買課へ
お問合せください

本店 購買 課	☎059-229-3519	安濃営農センター	☎0120-059-044
河芸営農センター	☎0120-085-040	津北部営農センター	☎0120-057-045
芸濃営農センター	☎0120-056-041	津中央営農センター	☎0120-057-046
美里営農センター	☎0120-057-043	津南部営農センター	☎0120-059-047

品種の違うイネが生えていませんか？
徹底防除で混入被害軽減
—前年と作付品種を変えた場合も対策が必要です—

雑草イネ対策こよみ



耕起前の除草剤

薬剤名	使用時期
ラウンドアップ マックスロード	耕起前 (雑草生育期)
プリグロックSL	春期水田耕起1ヶ月前 から直前まで
ザクサ液剤	耕起前 (雑草生育期： 草丈30cm以下)
バスタ液剤	耕起15日前まで (雑草生育期)

薬剤により使用薬量、希釈水量が異なります。
ラベルをよく読んで使用してください。

田植後の除草剤

①～③のセット散布処理が有効です！

	薬剤名	使用時期及び使用量	商品画像
①	メテオ ジャンボ	田植直後に散布 300g／10a	(10a用)
②	ウィナーL ジャンボ	田植7日～ 10日後に散布 500g／10a	(10a用／30a用)
③	カイリキZ ジャンボ	田植14日～ 20日後に散布 300g／10a	(10a用／30a用)

以下の品種を栽培している場合は上記除草剤を使用しないでください。
「ハバタキ」「オオナリ」「タカナリ」「モミロマン」「ミズホチカラ」「ルリアオバ」「おどろきもち」「兵庫牛若丸」「やまだわら」「とよめき」「みなちから」「ふくおこし」「ほそおもて」「夢十色」「華麗舞」

収穫後の石灰窒素

**農薬登録のある
石灰窒素**
を使用してください。
(散布後は耕起まで3週間あける)

収穫作業後も注意

- 収穫**
 - ・収穫作業を組織化する
 - ・品種ごとに収穫する
 - ・品の切り替え時にコンバインの清掃を行う
- 乾燥製法**
 - ・品種ごとに乾燥・調整する
 - ・品種の切り替え時に乾燥機・調整用機械の清掃を行う
- 機械等格納**
 - ・翌年の混入を防止するため、コンバインなどの格納時に清掃を行い、残留籾を取り除く

手取り除草するために、雑草イネの特徴を知ろう！

雑草イネの特徴（雑草イネの出穂後、コシヒカリ出穂が手取り除草の最適期です）

出穂	草丈	穂の長さ	籾の色	籾の脱粒
コシヒカリより早い	コシヒカリより高い	コシヒカリより長い	ふ先が赤い	出穂約2週間後から脱粒する

雑草イネ 穂長：約23cm コシヒカリ 穂長：約19cm

モミの拡大図
雑草イネ（ふ先が赤い）
通常のイネ

雑草イネ、脱粒しやすい

少しでも被害を抑えよう ジャンボタニシ対策こよみ

年間防除で被害軽減！
農薬と石灰窒素を上手に使おう！

活動期間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	ジャンボタニシ活動期間							冬眠（気温14℃以下～）				
農薬・石灰窒素（粒）による防除	稲を食べる期間 （田植後2～3週間）							地域に広まってしまったジャンボタニシを完全に駆除することはほぼ不可能です。 被害を最小限に抑えるために、地域全体で防除しましょう！				
	秋に散布できない場合 田植前 石灰窒素による防除手順 STEP 1 荒起し後、3～4cm湛水し、3～4日放置してください。ジャンボタニシが活動を始め、水中に出てきます。 POINT! ジャンボタニシは、水温が15℃以上になると活動が活発になります。 STEP 2 石灰窒素20～30kgを全面にむらなく散布して3～4日放置してください。 POINT! 石灰窒素の農業成分が殺菌効果を発揮します。 STEP 3 代かきを行い、2～3日おいて田植してください。 POINT! 強制湛水せず、自然減水を持つ ※薬害が生じる恐れがありますので石灰窒素を散布してから田植えまで7日以上空けましょう。 ※窒素が含まれますので基肥量の調整が必要です。 JA営農渉外担当までご相談ください。 スクミンベイト3 2～4kg/10a または スクミノン 1～4kg/10a 2回目の防除をしましょう （スクミノンは使用回数、年2回以内） ※必要に応じて							目を素手で触らない 石灰窒素による防除方法については圃場に湛水できることが大前提となります。 ジャンボタニシ防除には、 農薬登録のある石灰窒素 を使用してください。 活動期間中は田んぼに水が入り次第活動を開始します。 田植直後から防除を心がけてください。 農薬使用のポイント （スクミンベイト3、スクミノン共通） ○ジャンボタニシは深水になっている場所に集まります。田んぼ周囲に溝を作り、ジャンボタニシを集めて薬剤防除するのが効果的です。 ○農薬を食べさせることで効果を発揮しますが、農薬散布後、3～4日程で粒が崩壊します。 ジャンボタニシは崩壊した粒は食べないので、必要に応じて2回目の防除を実施しましょう。				
効果的な対策・管理方法	稲が生育している時には！ 大切な3つのポイント											
	① 貝を水田に入れない		水口、水尻に金網（1～2cmメッシュ）またはネット（9mm目）を張る									
	② 貝を増やさない		貝を潰す。ピンク色の卵塊を水没させる ※卵塊が白色の場合はすでに稚貝が発生しているおそれがあるので、水没させず潰して駆除してください									
	③ 貝に稲を食べさせない		4cm以下の浅水管理を行う				農薬防除と併用するとより効果的です					
	冬季には！ 耕うんして貝を潰しましょう！											
	① トラクターの走行速度を遅くする		② 回転数をできるだけ上げる		③ 深さは浅くても良い（5cm）		特に水口、畦畔附近は密度が高いため丁寧に					

※薬害が生じる恐れがありますので石灰窒素を散布してから田植えまで7日以上空けましょう。
※窒素が含まれますので基肥量の調整が必要です。
JA営農渉外担当までご相談ください。

スクミンベイト3
2～4kg/10a
または
スクミノン
1～4kg/10a

2回目の防除をしまして（スクミノンは使用回数、年2回以内）

※必要に応じて

農薬使用のポイント
（スクミンベイト3、スクミノン共通）

○ジャンボタニシは深水になっている場所に集まります。田んぼ周囲に溝を作り、ジャンボタニシを集めて薬剤防除するのが効果的です。
○農薬を食べさせることで効果を発揮しますが、**農薬散布後、3～4日程で粒が崩壊します。**
ジャンボタニシは崩壊した粒は食べないので、必要に応じて2回目の防除を実施しましょう。

深水に集まるジャンボタニシ

田んぼ周囲の溝

稲が生育している時には！ 大切な3つのポイント

① 貝を水田に入れない
② 貝を増やさない
③ 貝に稲を食べさせない

水口、水尻に金網（1～2cmメッシュ）またはネット（9mm目）を張る
貝を潰す。ピンク色の卵塊を水没させる
※卵塊が白色の場合はすでに稚貝が発生しているおそれがあるので、水没させず潰して駆除してください
4cm以下の浅水管理を行う

農薬防除と併用するとより効果的です

冬季には！ 耕うんして貝を潰しましょう！

① トラクターの走行速度を遅くする
② 回転数をできるだけ上げる
③ 深さは浅くても良い（5cm）

特に水口、畦畔附近は密度が高いため丁寧に

○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベルの記載以外には使用しないでください。○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。○農薬の空袋、空容器などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。○防除日誌を記帳しましょう。

ジャンボタニシの基礎知識

- ジャンボタニシは水田や土中や、水路等で越冬します。
暖冬の翌春は発生が多くなります。
(特に水中では越冬しやすくなります)
- 気温が上がり、水田に水が入ると活動をはじめ、水路からも侵入します。
- 水温が約15℃以上になると摂食活動を開始します。ジャンボタニシは、自分の殻の高さ以上の水深がないと活発に動けません。よって、水の深い場所に集まりやすい習性があります。
- 田植後約3週間までの苗が特に被害を受けやすく、被害が多いと欠株になります。
- 夜間に水上に出て産卵します。条件が良ければ3、4日に1度産卵します。
これが2、3か月続くので、メスは一生に数千の卵を産むことになります。
- 卵は水中で呼吸できないため、水中に沈めると死んでしまいます。



**薬剤防除が有効ですが、薬剤だけでなく以下の耕種防除も
(薬剤以外の防除) 併せて行うとより効果的です。**

- 土壌中の越冬貝の防除 (秋季の石灰窒素施用、冬季耕うん)
- 水田・水路の防除 (卵の除去・水路の泥上げ)
- 水路からの侵入防止 (取水口にネットや金網を設置する)

石灰窒素には、 次の3つの効果があります

1. 稲わら腐熟促進効果 (土づくり効果)

秋の稲わらすき込み時に稲わらの上に石灰窒素を散布し、すき込めば、代かきまでに稲わらがよく腐熟して、初期の窒素不足、ワラ浮きやガスわきなどの問題が少なくなり、良質米生産につながります。

2. 秋に散布してノビエを退治！！

「石灰窒素」の主成分「シアナミド」には、ノビエの種子の休眠を覚醒させる効果があります。秋の稲刈り後、できるだけ早く石灰窒素を散布することで、田面に落ちているノビエの種子が発芽し、冬の寒さで枯れます。

3. ジャンボタニシの防除に！！

石灰窒素は、水田のジャンボタニシ (スクミリングカイ) 退治に効果が認められ、農薬登録を受けています。



20kg 当用価格／3,650円
引取価格／3,400円
配達価格／3,450円

スクミンベイト3

※2～4kg/10a、散布

- ① 使用時期・回数の制限がないため、スクミリングカイ発生時にいつでも散布可能。
- ② 摂食することで中毒症状を生じ、殺貝効果を発揮。
- ③ 水生生物への影響が少なく、環境への負荷が低い。



2kg入

当用価格／3,110円
予約価格／2,710円

スクミハン

※1～4kg/10a、 散布、2回以内

- ① 主に食毒で作用し、ジャンボタニシに対し急速な麻痺を引き起こす。
- ② ジャンボタニシに対する誘引性を持っており、処理直後に誘引効果を示す。
- ③ 摂食したジャンボタニシに対し、極めて速効的な作用を示す。



2kg入

当用価格／3,260円
予約価格／2,860円



8kg入

当用価格／12,000円
予約価格／10,400円

○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベルの記載以外には使用しないでください。○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
○農薬の空袋、空容器などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。○防除日誌を記帳しましょう。

白未熟粒の軽減対策


近年、三重県産米の品質は、登熟期の異常高温によって米粒が白く濁る『白未熟粒（シラタ）』となり、米の等級が低下する要因となっています。

白未熟粒（シラタ）とは、登熟期に高温や日照不足などの強い影響を受けるとデンプンが詰まりきらないうちに登熟が終了してしまい、デンプンの詰まらなかった細胞には空気の間隙ができ、白く見えます。この白く見える粒を総称して『白未熟粒（シラタ）』と呼びます。**※図①参照**

白未熟粒は、出穂後20日間の平均気温が27℃を超えると急激に増加をします。

また、発生要因は気象条件だけでなく、稲の出穂後の栄養不足や早期落水などの複合的な要因も考えられています。


図 1



津市の平均気温が27℃以下になる頃**※図②参照**に出穂時期を迎えるように田植えを行うことが望ましいが、その場合、田植えが6月上旬頃と推測されます。

作付け時期を遅らせる、もしくは作付け時期の遅い晩生品種に変更することが白未熟粒を軽減させるためにはもっとも有効と考えられますが、現状では困難であるため、JA津安芸としては右記のような方法を白未熟粒軽減対策として提案します。

図 2. 気象経過（津気象台アメダスデータから作成）



○土づくり

ケイカルなどの土壌改良資材を収穫後に散布し、根張り良く、しっかりとした稲を作り、倒伏や病害虫を発生しにくくして収量・品質を向上させる。

○早期落水の防止

早期に落水することにより土壌水分が低下して、株が枯れ、白未熟粒が発生しやすくなるので収穫7日前までは落水せず、土壌水分を維持させる。


○白未熟粒軽減資材の活用

現在、津安芸管内では水稻栽培面積の約70％が元肥一発肥料となっています。三重県では近年の白未熟粒による1等米比率の低下を受け、研究を重ねた結果、発生要因の1つとして出穂後の窒素不足が影響していることが確認できました。このような背景のもと、従来の『エムコート824』より緩効性窒素（追肥成分）の割合を高めた**※図③参照** 白未熟粒軽減資材『エムコート022』を県下JAでは数年前より試験を行いました。その結果**整粒歩合の向上・白未熟粒発生率の低下・外観品質の向上**が確認されております。

※但し、気象条件等により効果に差があります。

エムコート022 (チッソ20%-リンサン12%-カリ12%)

図 3. チッソ成分の溶出パターン



従来の元肥一発肥料より稲作後半の追肥成分の割合を多くし、出穂期以降の窒素不足を補い白未熟粒の発生を軽減させます。

◎JA津安芸では白未熟粒の発生を軽減する一発肥料をお奨めします。

オススメ


白未熟粒軽減用 元肥一発肥料

エムコート022

最近の夏、暑いので、穂肥分パワーアップしました!!

新 エムコート022		(従来品)	
元肥に効く部分	穂肥に効く部分	元肥に効く部分	穂肥に効く部分
約30%	約70%	約40～45%	約55～60%

◎チッソ成分の溶出パターン



●成分: チッソ リンサン カリ
20 - 12 - 12

●施肥量: 35kg～40kg/10a(コシヒカリ)
(土壌条件により適宜増減してください)

施肥量による、チッソ投入量

施肥量	30kg	35kg	40kg	45kg
チッソ投入量	6kg	7kg	8kg	9kg

※エムコート824(チッソ18%銘柄)の場合
40kg施肥すると、チッソ投入量は7.2kg
45kg施肥すると、チッソ投入量は8.1kg

この肥料だけでは“白未熟粒”を完全に抑えることは出来ません。

◆当用価格/4,000円 ◆引取り価格/3,500円 ◆配達価格/3,550円

白未熟粒軽減対策!! 元肥一発!!


セラコートR822

チッソ リンサン カリ
18 - 12 - 12

成分比較

	チッソ			(%)	
	全量	速効性	セラコートR 緩効性	リンサン	カリ
セラコートR822	18	5 28%	13 72%	12	12
従来品	18	8 44%	10 56%	14	15

溶出イメージ



特徴

元肥相当量を抑えた穂肥重点型の一発型肥料です。
田植えから最高分けつ期までの生育はR845より抑制されます。
最高分けつ期以降、緩効性チッソ(セラコートR)の溶出が始まり、
穂肥時期にはほぼ変わらない外観になります。
出穂以降は、穂肥のウエイトを上げたR822のほうが葉色が濃くなります。

施肥量

35～40kg/10a(コシヒカリ)

・土壌条件により施肥量を加減してください。

高温障害対策は、肥培管理だけではなく、土作り、水管理、
適正収穫なども重要な対策ですので合わせて取り組んで
いただきますようお願いします。

◆当用価格/3,700円 ◆引取り価格/3,450円 ◆配達価格/3,500円

ミネラス入り 水稻元肥一発肥料!

エムコート824

成分

単位: %

全量	チッソ		リンサン	カリ	マンガン	ホウソ
	速効性+つなぎ肥分	エムコート				
18	7.2	10.8	12	14	1.3	0.4

特長

- ミネラスは、人間にとって大切な「ビタミン」のようなもので、食味や登熟向上につながる、良食味米を作るには欠かせない成分です。

☆元肥一発（省力施肥） +
ミネラス（食味・登熟向上） = 農家の味方！

- ミネラスは根の活力を上げますので、下葉の枯れ上がりやゴマ葉枯れの予防となり、光合成能力を高め、結果的に元気な稲作りを助けます。

施肥基準量

- 40kg／10a（コシヒカリ）

品種、土壌条件によって適宜増減して下さい。



◆当用価格／4,450円 ◆引取り価格／4,050円 ◆配達価格／4,100円

あきたこまち・みえのえみ用 元肥一発肥料

早生品種用

エムコート489

成分

(%)

チッソ			リンサン	カリ
全チッソ	アンモニア態チッソ	エムコートS80H		
24	12	12	8	9

特長

- ✓ この肥料は水稻早生品種の要求に合わせた窒素溶出を現しますので追肥の必要がありません。
- ✓ 基肥として速効性のアンモニア態チッソが、また穂肥用としてエムコートS80Hが溶出を開始します。
- ✓ 高チッソ成分の為、施肥量が少量ですみます。

使い方

- ✓ 水稻 : 全量基肥施肥
- ✓ 施肥基準量 : 30kg／10a
土壌条件によって適宜増減して下さい。
※詳しくは農業指導機関、またはJAにご相談下さい。

◆当用価格／3,600円 ◆引取り価格／3,350円 ◆配達価格／3,400円



セラコートR2500(中晩生)

(セラコートR2500CEFG)

(%)

チッソ			リンサン	カリ
全量	速効性	セラコートR		
25	10	15	10	10

特 長

- 元肥一発タイプですから穂肥が省略できます。
4タイプのセラコートR（R50・R90・R110・R130）が入っていますので、生育中期から後期まで安定した肥効を示します。
- セラコートRの被覆材は、植物性成分が主体ですから環境にやさしい肥料です。
- リンサン・カリの成分が低いので、堆きゅう肥資材の施用をお奨めします。

基準施肥量

◎ 45kg～55kg/10a

・ 土壌条件により施肥量を加減してください。



◆ 当用価格／3,900円 ◆ 引取り価格／3,600円 ◆ 配達価格／3,650円

オススメ

稲侍一発 エムコート2877

水稻用基肥一発

15kg袋で
発売

チッソ 28
リンサン 7
カリ 7



成 分

チッソ				リンサン	カリ
全チッソ	全チッソ	全チッソ	全チッソ		
28	6	2.7	19.3	7	7

特 長

○この肥料は、低コスト、省力(軽量、一発)を目的とした肥料です

○チッソは3種類からなっており、生育初期から分けつまでは速効性チッソとエムコートL40が、幼穂形成期から出穂期まではエムコートS100Hが肥効を現します。

○チッソの内訳は、既存「エムコート022」と同じです

速効性 21% エムコートL40 10% エムコートS100H 69%

○この肥料は低リンサン・カリとなっていますので、土壌改良材の施用や、土壌診断を活用され、品質の安定に努めて下さい

施肥量

10aあたりの標準施肥量

コシヒカリ 25kg～30kg(チッソ 7.0kg～8.4kg)

※土壌や地域などにより適宜増減して下さい

◆ 当用価格／3,250円 ◆ 引取り価格／2,950円 ◆ 配達価格／3,000円

新登場

環境保全型肥料

微生物分解性硫黄被覆肥料入り

マイルドSB コシ専用200

コシヒカリの生育に適しています

正味:20kg

チッ素			リン酸	カリ	苦土
速効性	緩効性				
20.0	3.5	16.5	10.0	10.0	1.3

※緩効性チッ素のうち、60～80日型:7.5% 110日型5.0% 140日型4.0%

《特長》


・この肥料は速効性の化成肥料と2種類の緩効性をブレンドしている**元肥一発型肥料**です。
初期成育を確保すると共に生育後期の栄養凋落が少なく、高い登熟成と収穫量が期待できます。
※コシヒカリ圃場施肥量の目安:2袋/10a

・緩効性のチッ素は、硫黄被覆肥料・ウレアホルムです。土壌微生物によって分解されますので
圃場に殻が残りません。


・この肥料は成分の流亡が少なく、地下水や河川などの汚染を抑制する**環境保全型肥料**です。

・側条施肥機でも使用できます。


硫黄被覆肥料の構造



◆硫黄被覆の分解過程



マイルドSBコシ専用200 肥効モデル



◆当用価格/3,900円 ◆引取り価格/3,600円 ◆配達価格/3,650円

有機質肥料でおいしい米作りを!!

★化学肥料を全く使用しておりません!

元肥

有機アグレット674

保証成分(%)			
チッソ	リンサン	カリ	苦土
6	7	4	1

天然由来
100%



施肥量:40kg(2袋)～60kg(3袋)

※側条施肥対応

穂肥

有機ブリケット038号

保証成分(%)		
チッソ	リンサン	カリ
10	3	8

有機
約81%



●窒素10%の内、7.5%が有機態窒素なので、
特別栽培農産物に安心して使用して頂けます。

施肥量:30kg(1.5袋)～40kg(2袋)

有機アグレット674 ◆当用価格/3,200円 ◆引取り価格/3,000円 ◆配達価格/3,050円
有機ブリケット038号 ◆当用価格/3,200円 ◆引取り価格/3,000円 ◆配達価格/3,050円

“稲”本来の抵抗力を最大限に引き出します

発泡型投込み剤

ファイト・アップ(水田用)

10アール当りの
投込み量が半分に
なり、より簡便!



【肥料登録品】

投げ込むだけで
穂に活力!!



● 根張りアップ

止め葉から数えて3枚の葉が出てくる
時期に、それらにつながった根を保護し、
さらに下位節間を丈夫にします。

● 食味アップ

収穫まで葉先枯れることなく葉を
しっかりと殖し、葉の未消化窒素を
分解し、質の高いデンプンを穂に供給。

● 歩留まりアップ

低温などのストレスから幼穂を保護し、
不稔を抑え、同化養分の転流を促進し、
「クズ米」を少なくします。

通常栽培の場合

使用時期

疎播栽培の場合

直播栽培の場合

幼穂形成始期
出穂30~45日前

1回の投げ込みで、幼穂を保護し、
収穫までの根を生かす

施肥量 10アールあたり
1袋(10錠)投込み

○さらに効果的 天候不順・低温下での分けつ促進→田植え後2週間以内

生育初期 + **幼穂形成始期**
・直播:2~4葉期
・疎播:田植え後7~10日
出穂30~45日前

初期生育を促進し有効な分けつを
確保し強い健康な稲に

施肥量 10アールあたり
0.5袋(5錠)投込み + 10アールあたり
1袋(10錠)投込み

使用の際の注意事項

- 必ず5cm以上灌水して、下手投げで投げ込み使用。
- なるべく天気の良い日の午前中に施用する。
- 投込み後3日は足し水、かけ流し、落水しない。
- 根を傷めないよう、施肥後の極端な中干しは避けてください。

◆当用価格/3,560円 ◆引取り・配達価格/3,430円

オススメ

長〜く効くので、

春

はる

施用ができる加里資材!

けい酸加里
プレミア34

春施用の場合

代かき前までに
30kg~40kg/10a

中間追肥の場合

田植え後30日~45日
20~40kg/10a

※作土の全層に混和されるので、
施用量は少し多くなります。

中間追肥ができない方

ズッシリ!!
ビッシリ!!
ピン!!
ガッチリ!!

田植え

中干し

収穫

○水稻一発肥料の使用で、**登熟期**の加里と、珪酸の補充に最適(白未熟軽減・登熟向上)

けい酸加里	農作業				
	代かき	田植え	中干し	【登熟期】	収穫
		一発肥料	窒素効果		
			リン酸効果		
			加里効果	けい酸加里で充実させる	
	けい酸加里 1反当たり 30~40kg		珪酸効果		

* けい酸加里は、く溶性の加里で代かき前の散布でも、登熟期まで効果は持続します。

● 従来の施肥 田植え後 30日~45日施肥 20kg~40kg / 反

◆当用価格/2,800円 ◆引取り価格/2,550円 ◆配達価格/2,600円



これであなたも
一発除草剤の
達人に!


初中期一発除草剤の効くしくみ

その1：どういう仕組みで雑草を枯らしているの？

⇒水田に一発剤を散布すると、土壌表層に草を枯らすための『**処理層**』ができます。
雑草の芽や根が『処理層』に触れた時に成分を吸収し、枯死します。

一発剤を散布した場合 ※粒剤の場合

①田んぼに水がある
状態で一発剤を散布。
粒が土壌表面に落ちます。




なにもしないと雑草は…

田んぼに水が入ると、
ノビエ、ホタルイ等
雑草の種が活動し始めます。

雑草の種

②粒から有効成分が溶け出し
水中で拡がります。




日が進むにつれて
芽や根が伸びてきます。

③有効成分が土壌表面に landing


処理層

が形成されます。



その後も生育を続け、
大きくなっていきます。

④処理層に触れた雑草の芽・
根より有効成分が吸収され、
雑草は枯れます！



処理層がないので、
枯れることなく
その後も大きくなります。


稲の根は「処理層」より
下層にあるので、
イネは枯れない!!

雑草だらけ

①「**処理層**」を作らせることで雑草を枯らすのです！

その2：いつ散布しても枯らすことができるの？


⇒雑草が生長してからでは手遅れ。
雑草が見える前に処理層を作らせることが大事です。



②散布する時期の見極めが重要！


その3：一発剤を散布しておけば確実に処理層がつくられるの？

⇒水がなければダメ。散布後最低3日間は水を維持できるような管理が大事です。
(水が切れても3日間は水を入れないようにしてください)




③処理層を作るためには水管理が重要！

気を付けよう！箱処理剤と水稻除草剤の違い




上記写真は除草剤を誤って箱剤として使用してしまった事例です。
※掲載している写真はすべて兵庫県で撮影しました。

水管理が重要！



除草剤が効きにくい圃場

改善しましょう！ 畦畔からの漏水




改善しましょう！ 水尻からの漏水




除草剤が効く圃場

漏水防止に！あぜ塗りの実施・あぜ波板の設置



入水の工夫！ 水の勢いを調整




水稻除草剤使用8ヶ条

- ①整地・代かきはていねいに。デコボコがないように。
②田植えは極端な浅植え、浮き苗が生じないように。
③散布後3～4日は3～5cm、湛水状態を保ちます。
④掛け流しはぜったいにしない。



- ⑤砂質土壌および漏水の激しい水田では使用しない。
⑥田面を露出させたり、水をきらしたりしないように。
⑦強還元田（厩肥・緑肥の未熟有機物を大量にすきこみ土壌中が酸素不足になっている田んぼ）での使用はやめよう。
⑧使用前には、容器ラベルの注意事項をよく読み、守ろう。



田植え同時処理除草剤の上手な使い方

- 1** 代かきは丁寧に行い、土壌表面を均一に保つこと。移植後24時間以内に十分な湛水深（3～5cm）が確保されるよう入水すること。
2 浅植えや浮き苗のないよう植え付け、適度な深度を保つこと。
3 極端に植え穴の戻りが悪い水田では田植え同時処理を行わない。

注意）浅植えや浮き苗は薬害の原因となります。



- 4** 除草剤の散布後の補植は、極力行わない。
5 代かきから田植えまで7日以上あいたら、あらかじめ初期除草剤を散布すること。

注意

除草剤の散布後の補植は、水田を歩行することにより、処理層を壊し、効果フレの原因となります。また、補植した苗の根が直後処理層に触れるため、薬害の原因となります。



注意

移植時までに雑草の生育が進み、効果が十分得られない場合があります。



基本に戻って
3つの安全
農産物 農家 環境

「安全・安心な農産物づくり」のために

食品衛生法の改正により、食品中に残留する農薬などの規制が厳しくなりました。定められた基準を超えて農薬などが残留している食品は販売が禁止されます。農薬は定められた使用方法に従って適切に使用すれば、何ら問題はありませんが、散布作業での思わぬ事故により農産物が販売できなくなるような事が起きないように、農薬散布においては十分な安全対策を行ないましょう。

農薬の適正使用と履歴記帳の徹底を



農薬の使用前には、使ってよい作物や使用量、濃度、使用時期、総使用回数などを農薬ラベルで確認し、これらを守ることが基本です。

散布後には、使用した農薬名や散布した量などを記帳しておきます。記帳することで成分ごとの使用回数や安全日数の確認が容易になり、また、使用基準を守っているかの証明にもなります。



環境への配慮も忘れずに



農薬散布時は、周辺圃場や住宅域、水域などに農薬が飛散することのないよう、十分に周辺環境に配慮しましょう。

また、水田での農薬散布は、圃場外に農薬が流出しないように、しっかりと止め水を行ないましょう。

育苗時の農薬散布もていねいに

育苗ハウスなどで育苗後に野菜などを栽培する場合は、後作への影響を防止するために、

- 農薬を施用する時は、後作を行なわない場所で施用するか、育苗箱からこぼれないよう丁寧に行ないましょう。
- 育苗ハウス土壌全面にビニールシートを敷くなど、地面への農薬の浸透を防ぎましょう。



高い効果で信頼されている種子消毒剤！

水稻用総合種子消毒剤

ホクコー モミガード[®]C・DF ドライフロアブル

による種もみ消毒法

有効成分：フルジオキシニル・・・2.0% ペフラゾエート・・・12.0% 塩基性塩化銅・・・7.6%（銅として4.5%）

1. 薬剤調整時の粉立ちが少なく、計量しやすい薬剤です。
2. 同じ重量でもカサが小さくなりコンパクト。
3. 水へ投入時のダマもなく、速やかに溶けます。
4. 希釈液の色が青白色のため汚れが目立たなくなりました。

特 長

3種類の有効成分により、ごま葉枯病、いもち病、ばか苗病はもちろん、細菌性病害の苗立枯細菌病、もみ枯細菌病、褐条病を同時防除できます。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	総使用回数	使用方法
稲	ばか苗病、ごま葉枯病 いもち病、もみ枯細菌病 褐条病、苗立枯細菌病	200倍	浸種前	本剤：1回 フルジオキシニル：1回 ペフラゾエート：1回 銅：—	24時間種子浸漬

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

種もみ消毒手順～24時間種子浸漬法の場合～

塩水選・水洗い	水切り袋づめ	消毒 (24時間薬剤浸漬)	薬液切り	浸種	芽出し処理	は種
						
☆塩分は完全に洗い流す。 比重1.13の塩水（生卵が浮く位）	○サラン網など目の粗い袋に七分目程度詰めます。	薬液量は種もみ重量の2倍 ★薬液は2000倍の濃度となるようにする（早見表参照）	★水で洗わない。	○風乾の必要はありません。	○酸欠不足の恐れがあれば、最初の二日はできるだけ換水せず、その後静かに換水してください。 （河川・湖・ため池など浸種しない） ★浸種は種もみ重量の4倍量の水で専用の桶などを用います。	○酸欠不足の恐れがあれば、最初の二日はできるだけ換水せず、その後静かに換水してください。

使用量早見表

モミガードC・DF 200倍
24時間種子浸漬法の場合

種もみ量 (キログラム)	4	5	8	10
モミガードC・DF (グラム)	40	50	80	100
薬液を作るのに 必要な水の量 (リットル)	8	10	16	20
スミチオン乳剤 (ミリリットル)	8	10	16	20

オススメ

苗をもっと活き活きと！

イネ苗立枯病防除剤

大好評！

ナエファイン[®] フロアブル

- ・ 1成分で3種（ピシウム、フザリウム、リザーパス）のイネ苗立枯病に高い効果を発揮！
- ・ 根の生育や活着を促進し、良質な苗づくりに貢献！
- ・ 箱当たり、2000倍500mlの登録を有しコスト面でも問題なく使用できます。

イネの根に
お困りの方は！



100ml



250ml

ナエファインは苗のマット形成を促進します

ナエファイン

対照区

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外に使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記載しましょう。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ナエファイン [®] を含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	苗立枯病(ピシウム菌)	1000倍～2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	は種時から緑化期	2回以内	土壌灌注	3回以内(但し、土壌灌注は1回以内、土壌灌注は2回以内)
		2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L～1L	は種時			
	苗立枯病(リザーパス菌) 苗立枯病(フザリウム菌)	1000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	は種時			
		2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り1L	は種時から緑化期			
稲(箱育苗)	育苗防止	1000～2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	は種時から緑化期	2回以内	土壌灌注	3回以内(但し、土壌灌注は1回以内、土壌灌注は2回以内)
	根の生育促進、移植後の活着促進	2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L～1L	は種時			
	育苗防止 根の生育促進、移植後の活着促進	1000倍～2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	は種時から緑化期			

◆当用価格／790円 ◆引取り価格／700円 ◆配達価格／730円

◆当用価格／1,900円 ◆引取り価格／1,770円 ◆配達価格／1,800円

オススメ

新登場

カメムシ対応の箱処理剤！



協友

デジタル®メガフレア®

箱粒剤

®はシンジェンタ社の登録商標

これからは、いもち病、カメムシ対策も箱処理で!!

- 箱処理で初めてカメムシ類を防除できる画期的な製品です。
- カスミカメムシ科等の小型カメムシ類に高い効果があります。占有種を病虫害防除所等関係機関へ確認の上、使用して下さい。
- いもち病、ウンカ類の主要害虫にも高い効果と持続性を発揮します。
- 箱処理なので、散布適期を逃さず、高品質米の生産に貢献します。



葉いもち



イネミズゾウムシ



アカヒゲホソミドリ
カスミカメ



アカスジカスミカメ



※穂いもちの発生状況により追加防除が必要な場合があります。

適用病虫害および使用方法

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキシムを含む農薬の総使用回数	ピロキロンを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植当日	1回	育苗箱中の 苗の上から 均一に散布する	3回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田では2回以内)	3回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田では2回以内)
	カメムシ類、ウンカ類、 イネミズゾウムシ、 イネドロオイムシ、 いもち病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植前3日～ 移植当日				

★使用前にはラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★本剤は小児の手の届く所には置かないでください。★空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

◆当用価格／5,100円 ◆引取り価格／4,350円 ◆配達価格／4,400円

※本剤だけの使用だけでは、必ずしも斑点米カメムシ類による被害が防げるとは限りません。

※斑点米カメムシ類対策には、本田防除と合わせてお使いください。

オススメ

次世代の新規有効成分ブーン配合



いもち病

新規殺菌剤
ジクロベンチアゾクスが
いもち病を徹底防除！

3成分で 徹底防除

初期害虫

新規殺虫剤
テトラニリプロールが
初期害虫に効く！

紋枯病

殺菌剤成分
ペンフルフェンが
紋枯病を防除！

新登場

水稻 育苗箱専用 殺虫・殺菌剤

ブーンレパード®

箱粒剤

- ・イネいもち病、紋枯病、初期害虫、チョウ目害虫に対し
高い効果と長期残効を示します。
- ・水稻に対する**安全性**が高く、**は種時～移植当日**まで幅広い
時期に使用することができます。

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲(箱育苗)	いもち病 紋枯病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	育苗箱 (30×60× 3cm、使用土壌約 5L) 1箱当り50g	は種時 (覆土前) ～移植当日	1回	育苗箱の上から均 一に散布する

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記載しましょう。

◆当用価格／4,600円 ◆引取り価格／3,900円 ◆配達価格／3,950円

「育苗箱処理」で、主要病害虫を同時防除!!

水稻育苗箱専用殺虫殺菌剤

ツインターボ® 箱粒剤 08

省力・コスト低減にも貢献します!

お得な**40kg**規格も登場!

※20kgのケース×2セット
の容器にてお届けします。

特 長

- いもち病防除に、新定番ルーチンを配合し、長く予防します。
- 「クロチアニジン」で初期害虫を効率的に防除!
- は種前から移植まで、幅広い使用が可能です
- お得な大型規格(10kg、40kg) もあります



主要病害虫予防
に有効です!!

●適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病、白葉枯病 内臓褐変病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 イネミスゾウムシ、イネドロイムシ ウンカ類、イネヒメモグリハエ ツマグロヨコバイ	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種時(覆土前)～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	4回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
	いもち病、白葉枯病 内臓褐変病 苗立枯細菌病 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) 穂枯れ(ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 イネミスゾウムシ、イネドロイムシ ウンカ類、イネヒメモグリハエ ツマグロヨコバイ		は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する		
	苗立枯細菌病 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌)		は種時(覆土前)		育苗箱の上から均一に散布する		

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。 ●防除日誌を記載しましょう。

◆当用価格/3,720円 ◆引取り価格/3,250円 ◆配達価格/3,300円

初期除草剤 2つの成分でしっかり抑える!

サキドリ®EW

草は
生える
前に取る!!



- ◇2成分で初期の雑草を長くしっかり抑えます。
- ◇難防除雑草にも体系処理で有効です。
- ◇臭いが少ないEW製剤です。

SU抵抗性雑草にも有効!



サイズは
500mlと
2リットル
大型ボトル
(40a分)

ご注意!!

田植前に使用する場合、” 田植7日前まで” にご使用ください。

上手な使い方

(散布後は雑草の種類や発生状況に合わせて、一発処理剤や中期除草剤を体系で使用して下さい。)

代かき 7日前 田植 5日後(ル I1葉期目安)

使用
適期

使用時期

一発剤
または
中期剤

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ブタクロールを含む農薬の総使用回数	ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツハイ ホタルイ ヘラオモタカ ミズガヤツリ クロクワイ コウキヤガラ	植代後～移植前7日 または 移植直後～ル I1葉期 ただし、移植後30日まで	500ml/10a	1回	原液湛水散布	2回以内	2回以内
		移植時			田植同時散布機で施用		
		植代時(移植7日前まで)			植代時に原液のまま散布し混和する		
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツハイ ホタルイ ミスガヤツリ	湛水直播の代かき時(は種7日前まで)	300ml/10a		代かき時に原液のまま散布し混和する		
		湛水直播の代かき後～は種前7日			原液湛水散布		

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。 ●防除日誌を記載しましょう。

◆当用価格/1,580円 ◆引取り価格/1,320円 ◆配達価格/1,370円

オススメ

クラール^{EW} 1キロ粒剤

水稻用初期除草剤

クリアな水田をキープしたい。

- ✓ 2つの成分の組み合わせ
- ✓ 「ブタクロール」と「ジメタメトリン」の相乗効果により安定して雑草の発生を抑えます
- ✓ 発生前の藻類に対し7～14日程度の予防効果が期待できます

藻類
に効く成分
ジメタメトリン
配合

- ① ノビエ、ホタルイなどの一年生雑草に効果を示す
- ② 藻類の発生を抑制するので、稲のなぎ倒しや、水温低下も防ぎます
※処理後7～14日程度期待できます
- ③ 藻類の発生を抑制するので、次のジャンボ剤処理時に拡散が阻害されにくい

【おすすめ使用例】地域・条件によって異なります

クラール剤

10日後

初中期一発除草剤
ジャンボ剤など

藻類を予防しているうちに処理



剤型	作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
粒	移植 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ アオミドロ・藻類に よる表層はく離	移植時	1kg/10a	1回	田植同時散布機で施用
			移植後～移植7日前 又は 移植直後～11.5葉期 ただし、 移植後30日まで			温水散布 又は 無人航空機 による散布
EW	移植 水稲		移植後～移植7日前 又は 移植後1日～11.5葉期 （但し、 移植後30日まで	500ml/10a		原液温水散布

EW ◆当用価格／1,480円 ◆引取り価格／1,270円 ◆配達価格／1,320円
1キロ粒剤 ◆当用価格／1,320円 ◆引取り価格／1,170円 ◆配達価格／1,220円

20周年
特価

愛され続けて20周年
トップガンがついにリニューアル!!

初・中期一発処理除草剤

新登場

トップガンR

フロアブル



500ml



2L



安心・安全
ロングセラーの
変わらぬ信頼



これからもトップガンで決まり!

発売20周年を迎えた「トップガン」が「トップガンR」に進化！
有効成分そのままに、ベンスルフロンメチル含有量を増加！
各種雑草に対する効果を安定化！

適用と使用方法（ピリミノバックメチル 0.83%・プロモブチド 17.0%・ベンスルフロンメチル 1.3%・ペントキサゾン 2.8%）

剤型	有効成分	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数	使用方法
フロアブル	移植水稲	一年生雑草及び、マツバイ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ ヒルムシロ、セリ、オモダカ クログワイ、シズイ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	500ml/10a	1回	田植同時散布機で施用
			移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで			原液温水散布

500ml ◆当用価格／3,600円 ◆引取り価格／2,770円 ◆配達価格／2,850円

オススメ

水稲用・初中期一発除草剤

エンペラー

1キロ粒剤


ジャンボ




エフィーダ配合
雑草に広く効く!!

一発除草剤の“皇帝”が君臨!!!
しつこいホタルイによ〜く効く!

管内での効果事例



白化したホタルイ(〜3葉期)



白化したコウキヤガラ

ワイドに枯らす。速効的に枯らす。

1キロ粒剤

ジャンボ



1キロ粒剤



1キロ粒剤 (1町用)



ジャンボ

ジャンボ (3反用)

- 新規成分 **エフィーダ®** (フェンキノトリオン)を配合。
- 雑草を**素早く白化**させて枯らしめます。
- ホタルイ**・**ヒエ**・**コウキヤガラ**・**オモダカ**等に高い効果。
- イネ**に対する安全性が高く、安心して使えます。

剤型	有効成分	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数	使用方法
1キロ粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、ツリカ、 ホタルイ 、クサギ、 コウキヤガラ 、セリ、ヒルムシロ、ハラオモダカ、 ホタルイ 、マツバ、ミズガヤツリ アモト・藻類による表層はく離	移植直後〜 ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで 移植時	1kg/10a	1回	湛水散布 田植同時散布機で施用
剤型	有効成分	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数	使用方法
ジャンボ	移植水稲	水田一年生雑草、ツリカ、 ホタルイ 、クサギ、 コウキヤガラ 、シズイ、セリ、ヒルムシロ、ハラオモダカ、 ホタルイ 、マツバ、ミズガヤツリ アモト・藻類による表層はく離	移植直後〜 ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (250g) /10a	1回	水田に小包装 (パック) のまま投げ入れる

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記載しましょう。

1キロ粒剤 ◆当用価格／ 3,550円 ◆引取り価格／3,070円 ◆配達価格／3,150円
ジャンボ 250g ◆当用価格／ 3,650円 ◆引取り価格／3,120円 ◆配達価格／3,200円
ジャンボ 750g ◆当用価格／10,600円 ◆引取り価格／9,100円 ◆配達価格／9,350円

オススメ



カウンシル
エナジー

ジャンボ



①カウンシルはバイエルグループの登録商標
②はクニアイ化学工業(株)の登録商標
③ジャンボは(公財)日本雑草防除研究協会の登録商標



大型規格
30a用



400g (1パック入り)



1.2kg (30/パック入り)

アゼから侵入する雑草 対策におすすめ!

※キシュウスズメノヒエ・イボクサは本田侵入前・発生始期まで



無処理区



キシュウスズメノヒエ



イボクサ

難防除雑草には
高い除草効果と併せて
塊茎形成抑制を確認



クログワイ



オモダカ



コウキヤガラ

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り 使用量	使用回数*	使用方法
移植水稲	一年生 および 多年生雑草	移植直後〜ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (400g)	本剤 1回 トリアファモン 2回 フェンキノトリオン 2回 フェントラザミド 1回	水田に 小包装(パック)のまま 投げ入れる
直播水稲	一年生雑草 および マツバ、ホタルイ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期〜ノビエ3葉期 ただし、 収穫90日前まで			

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

使用時期

使用時期は、移植直後からノビエ3葉期まで、ただし移植後30日までです。
一発処理の目安を日数で示しました。ノビエの発生状況を確認して適期に散布して下さい。



●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

400g ◆当用価格／ 3,920円 ◆引取り価格／3,270円 ◆配達価格／3,350円
1.2kg ◆当用価格／10,690円 ◆引取り価格／9,400円 ◆配達価格／9,650円

当JA売上
No.1

ノビエに効く！ホタルイにも高い効果！！

水稲用一発処理除草剤

ファイブ®

ヒエ除草に
大好評

1キロ粒剤51

Lフロアブル

Lジャンボ

®は北興化学工業株式会社の登録商標




◆代かきから10日以内の散布がおすすめです（ただし移植後）

特長

▼ノビエに長い効果！
ノビエの多い圃場に
オススメ！

あぜ塗り
あぜシート等
しましょう！
（水持ちが良くなります）

▼粒剤・フロアブルは田植同時処理、
ジャンボ剤は田植直後から散布でき
るので、藻類が出る前に散布可能！



田植同時処理ができる。

藻類



ホタルイ

2~2.5葉期

3.5葉期

▼幅広い雑草に効果があります。ホタルイにも
高い効果！ホタルイは2葉期までが散布
適期です。早めの散布をオススメします。

○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベルの記載以外には使用しないでください。○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
○空袋、空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。○防除日誌を記帳しましょう。

1キロ粒剤 ◆当用価格／ 3,620円 ◆引取り価格／2,970円 ◆配達価格／3,050円
Lジャンボ500g ◆当用価格／ 3,820円 ◆引取り価格／3,170円 ◆配達価格／3,250円
Lジャンボ1.5kg ◆当用価格／10,490円 ◆引取り価格／9,200円 ◆配達価格／9,450円

特別
価格

コメツト ジャンボ

水稲用一発
処理除草剤

問題雑草の
ホタルイ・オモダカ
コウキヤガラなど
多年生雑草の地上部
だけでなく地下部も抑える

ホタルイ

オモダカ

コウキヤガラ

お得な
3反規格
あります



作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植 水稲	水田一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、 ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ クログワイ、シズイ、コウキヤガラ	移植後5日～ ノビエ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装（パック） 10個 （300g）/10a	1回	水田に 小包装 （パック） のまま 投げ入れる

1キロ粒剤 ◆当用価格／ 3,670円 ◆引取り価格／2,920円 ◆配達価格／3,000円
ジャンボ 250g ◆当用価格／10,590円 ◆引取り価格／8,600円 ◆配達価格／8,850円

水稲用一発処理除草剤

やっかいなノビエにも一発！

アルファプロ®ジャンボ®

フェノキサスルホン・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤

250g/10a (1反用) 750g/30a (3反用)

★有効成分「フェノキサスルホン」配合でノビエや一年生広葉雑草に長期残効を示します！

★有効成分「フェノキサスルホン」と「プロモブチド」の共力効果でコナギとホタルイの除草効果が高い！

★3反規格もラインアップ。



適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装(パック) 10個(250g) ／10a	1回	水田に 小包装(パック) のまま 投げ入れる。

フェノキサスルホンを含む 農薬の総使用回数	プロモブチドを含む 農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

●散布は、やや深めの湛水状態(水深3～5cm)にして、パックのまま10アールあたり10個、均等に投げ入れてください。



本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

●使用前にラベルをよく読んでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

250g ◆当用価格／ 3,700円 ◆引取り価格／3,020円 ◆配達価格／3,100円
750g ◆当用価格／10,200円 ◆引取り価格／8,750円 ◆配達価格／9,000円

水稲用中・後期除草剤

ニトウリュウ® ジャンボ®



◆湛水散布

◆地上部を枯殺し地下部の塊茎形成も強力に抑制

◆残効性強化



ニトウリュウジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ	移植後15日～ ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで	小包装 (パック) 10個 (500g) ／10a	1回	水田に 小包装 (パック)の まま 投げ入れる。
直播水稲	水田一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	稲4葉期～ ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで			

◆当用価格／3,900円 ◆引取り価格／3,170円 ◆配達価格／3,250円

オススメ

注目の新剤！

新登場

メタミホップ配合

水稲用中・後期除草剤



シアゲMF

1キロ粒剤



特長

■農林水産省：第24149号
■有効成分：
ピリミスルファン・・・0.60%
メタミホップ・・・0.90%
MCPB・・・2.4%

■人畜毒性(製剤)：普通物※
※「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく特定毒物、
毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

シアゲMFは科研製薬(株)の登録商標です

- 高葉齢ノビエに卓効を示す新規成分「メタミホップ」配合で、ノビエ4.5葉期まで使用可能(移植水稲)。
- 3成分の配合で、幅広い草種に高い効果。
- 多年生雑草クログワイ・シズイ(草丈30cmまで)、オモダカ(矢じり葉4葉期まで)に高い効果。
- コナギ、アゼナ等の一年生広葉雑草にも高い効果。

適用雑草と使用方法

2020年9月25日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数※	使用方法
移植水稲	一年生雑草及び キシュウスズメノヒエ、 多年生広葉雑草	移植後20日～ ノビエ4.5葉期 但し、 収穫60日前まで	1kg/10a	本剤 2回以内 ピリミスルファンを含む農薬 2回以内 メタミホップを含む農薬 3回以内 (乳剤及び液剤は合計2回以内) MCPBを含む農薬 2回以内	湛水散布 又は 無人航空機 による散布
直播水稲	一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ	稲3.5葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで			

※印は収穫物残留回避のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

ノビエ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	コウキヤガラ	ヒルムシロ
4.5葉期まで (移植水稲)	草丈10cm まで※	4葉期 まで	4葉期 まで	4葉期 まで	草丈30cm まで	矢じり葉 4葉期まで	草丈30cm まで	発生盛期 まで

セリ	キシュウスズメノヒエ	シズイ
増殖期 まで	再生茎 5葉期まで	草丈30cm まで

雑草が上記葉齢を超えない時期に散布して下さい。
キシュウスズメノヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用して下さい。
※登録は草丈20cmまでですが、安定した効果のため10cmまでの使用をおすすめします。

- 本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
- 本印刷物は2020年9月25日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。
- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 防除日誌を記載しましょう。

◆当用価格/3,600円 ◆引取り価格/2,920円 ◆配達価格/3,000円

オススメ

レブラス®

～多年生から一年生雑草まで主要雑草に高い効果～

- ・湛水散布
- ・4成分
- ・アルテア配合



・ジャンボ剤がおすすめです。


★主要雑草散布適期



クログワイ
20cm

ホタルイ
花茎10cm
※粒剤のみ
ジャンボ剤 4葉期

オモダカ
矢尻葉
3葉期



ヒレタゴボウも枯殺
(※5cmまで)
中干前の
発生前処理が
おススメ！

ジャンボ400g ◆当用価格/4,280円 ◆引取り価格/3,850円 ◆配達価格/3,930円

新登場

ロイヤントTM 乳剤

RinskorTM active

水稲用除草剤

- ・すばやい効果発現
- ・5葉期のノビエ
- 大きな広葉雑草に優れた効果
- ・散布2時間後の雨でも効果を発揮


- 農林水産省登録 第24387号
- 商品名:ロイヤント乳剤
- 有効成分:フオルピラウキシフェンベンジル(通称リンズコア)・・・2.7%
- 物理化学的性状:黄色可乳化油状液体
- 規格:200mℓ×20本
- 危険物:第4類第三石油類

除草剤分類 4



■ドリフト防止と散布器具の洗浄方法

- 散布時は、周辺作物に薬液が飛散しないよう十分注意してください。
- ロイヤント乳剤を使用した散布器具は、使用後速やかに以下の手順で十分に洗浄してください。散布器具内に残った薬液は、他の作物に影響を与えることがあります。
- ① 使用残りの薬液が生じないように調整し、使い切る。
- ② タンク内壁を含入りに洗浄しながら、タンク容量の10%以上の水をためる。
- ③ ホース、ノズルから洗浄水を排出する。
- ④ ②③の作業を3回以上繰り返す。
- ⑤ 散布器具の外部を丁寧に洗浄する。



■適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	30アールあたり使用量		総使用回数*	使用方法
			薬量	希釈水量		
移植水稲	一年生広葉雑草及びノビエ、マツバ、ミズガヤツル、ウリカス、セリ	移植後20日～ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで	200mℓ	100ℓ	本剤:2回 フオルピラウキシフェンベンジル:3回	湛水散布又は ごく浅く湛水して散布

*収穫物への残留回避のため、本剤およびフオルピラウキシフェンベンジルを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

■主な雑草の防除目安




ノビエのとりこぼし、キシウスズメノヒエに。

グリーンチャー1TM 粒剤

大きなノビエも
素早く倒す!

効果の発現が比較的速く、4～5葉のノビエには、散布後3日目には葉の黄化・褐変症状が現れ、7日～10日で完全に枯死させます。



どんな生育ステージの
稲にも安全

稲への優れた安全性が実証されています。稲の生育ステージを問わず、安全に製品を使用することが出来ます。



どんな状況でも任務遂行!

速やかに有効成分が茎葉から吸収されるため、散布後に降雨があっても効果に影響がほとんどありません。広い土壌(砂壤土～埴土)に使えます。

土に残らず、最後はドロン!

環境中で、有効成分は速やかに不活性化され分解されます。稲わらや土壌への残留の心配はありません。

使用方法



水管理について

●水面施用時	
ノビエ葉期	湛水深
4葉期まで	水深3cm 5cm
5葉期	水深5cm
●施用後の水管理 散布後3～4日は湛水状態を保持。散布後7日間は湛水、かけ流しはしないでください。	

■適用雑草と使用方法 本剤は対象雑草の生育ステージによって使用量が異なるので注意する。

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量	適用地帯	適用土壌	使用方法	総使用回数*
移植水稲	ノビエ キシウスズメノヒエ (関東以西) アゼガヤ (近畿中部・西国、九州)	移植後7日～ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで	1kg	全域の普通圃及び 早期栽培地帯	砂壤土～埴土	湛水散布または 無人ヘリコプター による散布	本剤のみ 2回 シバロホップブチル 3回
		移植後25日～ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで	1.5kg				
直播水稲	ノビエ	は種後10日～ノビエ3葉期 但し、収穫30日前まで	1kg	全域			
		は種後25日～ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで	1.5kg				

*本剤及びシバロホップブチルを含む農薬の総使用回数

◆当用価格/3,560円 ◆引取り価格/3,020円 ◆配達価格/3,100円

◆当用価格/1,730円 ◆引取り価格/1,520円 ◆配達価格/1,600円

水田多年生雑草防除剤

バサグラン粒剤

難防除雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果



水田の多年生雑草に対して、生育期の散布で優れた防除効果を発揮します。特に難防除雑草のクログワイ、オモダカ、ミズガヤツリなどに有効です。稲に対して薬害が少ない薬剤です。

落水またはごく浅く湛水してご利用下さい！

上手な使い方

一般に水深の浅いほど効果が安定します。

使用にあたっては落水状態(足跡に水が残っている状態)にして水の出入りを止め、まきむらのないように均一に散布してください。処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用してください。

直播水稲にも使えます

適用雑草と使用方法(一部抜粋)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草(イネ科を除く) マツハイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ エゾノサヤヌカサ シズイ	移植後15～55日 但し 収穫60日前まで	3～4kg/10a	1回	落水散布又は ごく浅く湛水して散布




コナギ



オモダカ



クログワイ



ホタルイ

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。●防除日誌を記載しましょう。

◆当用価格／3,310円 ◆引取り価格／2,920円 ◆配達価格／3,000円

穂いもち、速攻。

コラトップ®

粒剤5



特長

1. 葉いもち・穂いもちに安定した効果を発揮
2. 根から素早く有効成分を吸収
3. 使用適期幅が広く(出穂30日前から5日前まで)

適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫	使用量 (kg/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	総使用回数
稲	いもち病	3～4	葉いもちに対しては 初発10日前～初発時 穂いもちに対しては 出穂30日前～5日前まで	2回以内	散布	3回以内 (但し、育苗 箱散布は1回以内、 本田では2回以内)
	もみ枯細菌病	4	出穂30日前～5日前まで			



畦畔からパックを投げ込むだけ

コラトップ®

ジャンボP

適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	総使用回数
稲	いもち病	小包装 (パック) 10～13個 (500 ～650g) /10a	葉いもちに対しては 初発20日前～初発時 穂いもちに対しては 出穂30日前～5日前まで	2回以内	水田に小包装 (パック) のま ま投げ入れる	3回以内 (但し、直播での種時 又は移植時までの処理 は1回以内、本田では2 回以内)

使用上のポイント


- ・ いもち病多発環境下では、早めに散布してください。
- ・ 効果を安定させるために、推進3cm以上確保してください。
- ・ 散布後の水管理もしっかりと

粒剤5 ◆当用価格／2,550円 ◆引取り価格／2,130円 ◆配達価格／2,180円
ジャンボP ◆当用価格／3,460円 ◆引取り価格／3,100円 ◆配達価格／3,150円


カメムシ被害の発生しやすい条件

- 1. 夏の降水量が少ない。梅雨明けが早い。→高温少雨条件でカメムシの活動は活発となる。また、餌となる雑草の生育も旺盛となり、発生が増える。
- 2. 暖冬の年は越冬量が多い。
- 3. 周辺ほ場より出穂が早い。または遅い。→被害が集中する。できるだけ作期をまわりと揃える。
- 4. 周辺に休耕田が多い。→カメムシの餌となるイネ科の雑草が多く、繁殖地となる。
- 5. 水田内にイネ科雑草が多い。→稲の穂が出る前に出穂する個体があり、早くから水田内にカメムシを呼び込むことになる。

三重県の水田におけるカメムシ類の発生消長



カメムシ防除スケジュール



防除は地域ぐるみで行うと効果的です。

草刈りの徹底

・・・畦畔、農道、休耕田などの除草対策をこまめに行う。雑草の穂が出る前には草刈りを行う。出穂直前の草刈りを避け、出穂 1 5 ～ 1 0 日前に実施する。地域一斉に行うと効果的。


薬剤による防除

・・・発生が多い場合は 1 回では完全に防除しきれないため、できれば穂揃い期と乳熟期(1 回目防除の 7 ～ 1 0 日後)の 2 回防除を行う。地域一斉に行うと効果的。栽培上や作業上、1 回しか防除できない場合は、穂揃い期を重点に行う。

みんなでやろうカメムシ防除

防除は地域ぐるみで行いましょう！
被害が多いと収入減で損します！！

【主要な斑点米カメムシの特徴と生態】

【画像】 	【特徴】 ・ 飛翔能力が高い ・ 稲への選好性が高く、水田内でも増殖する。 ・ 成虫、幼虫とも斑点米生産能力は高い。 	【生態】 ・ 成虫の体長は15mm前後で緑褐色。活発に飛翔し、出穂にあわせて水田全面に飛来する。 ・ 杉、ひのきなどの林内で成虫越冬する。越冬成虫は、雑草地に飛来して増殖後、水田に侵入する。年2～3回発生する。 ・ 出穂期以降のイネに対する選好性が高く、水田内でよく増殖する。 ・ 斑点米は水田全面で発生し、早生品種は集中加害を受けやすい。
クモヘリカメムシ 	【特徴】 ・ 飛翔能力が高い。 ・ 稲への選好性が高く、水田内でも増殖する。 ・ 成虫、幼虫とも斑点米生産能力は高く、被害痕は大型になる。 	【生態】 ・ 成虫の体長は10mm前後で茶褐色。やや大型で、活発に飛翔する。 ・ 水田周辺の藪地などで成虫越冬する。発生回数は年2～3回。 ・ 出穂期に水田に飛来し、水田内で増殖する。 ・ 発生地は比較的限定され、常発しやすい。 ・ 早生品種で被害が大きい。
ホソハリカメムシ 	【特徴】 ・ 飛翔能力が高い ・ 比較的稲を好むが、多食性で麦や大豆も加害する。 ・ 斑点米生産能力が非常に高い。 	【生態】 ・ 成虫の体長は14mm前後で緑色。やや大型で、活発に飛翔する。 ・ 落ち葉の下などの地表面や常緑樹の樹幹内部で成虫越冬する。発生回数は年3～4回。 ・ 比較的稲を好むが、麦や大豆、野菜類や果樹類の果実も加害するため、水田以外の発生にも注意が必要。
ミナミアオカメムシ 	【特徴】 ・ 飛翔能力は低く、歩行で水田に侵入する。 ・ 多食性で雑草や稲の種子を好む。 ・ 斑点米生産能力は高く、被害痕は鮮明。 	【生態】 ・ オオトゲシロホシカメムシは富山以北の北陸・東北に、トゲシロホシカメムシ、シロホシカメムシは北陸以南の平坦地に生息する。 ・ 成虫の体長は4.5～7mm（トゲシロホシカメムシ）でこげ茶色。背面に1対の白点がある。 ・ 成虫または幼虫で水田近くの雑草で越冬し、年2～3回発生する。 ・ 歩行で水田に侵入するため、斑点米の発生は水田周縁部（がく縁）に多い。 ・ 発生は中山間地で多く、種子をつける植物（オオバコ、タデ科植物、イネ科雑草）の多い場所で発生が多い。
シロホシカメムシ類 	【特徴】 ・ 飛翔力は高い。 ・ 水田中央部まで飛翔して侵入する。 ・ 斑点米生産能力が非常に高い。 	【生態】 ・ 成虫の体長は約12mm。体色は黄褐色。 ・ 雑木林の落ち葉の下やススキなどの株間で成虫越冬する。4月頃から活動を開始し、年1～2回発生する。 ・ 一時、ほとんど発生が見られないほど減少したが、近年、一部地域で多発するようになった。 ・ 水田で恒常的に問題となることは少ないが、斑点米生産能力極めて高いため、発生が見られた場合は注意が必要。
イネカメムシ 	【特徴】 ・ 飛翔力は弱く、長距離移動はしないが、水田中央部まで飛翔して侵入できる。 ・ イネ科植物の種子を好む。 ・ 斑点米生産能力は高くないが、発生量が多い時や割れ粳に対しては実害が大きい。	【生態】 ・ 成虫の体長は5mm程度で、背面が赤い筋状に見える。 ・ イネ科植物のみに寄生し、その穎果内に産卵するが、稲には産卵できず、稲で繁殖することはできない。 ・ 近年、水田内のホタルイの穂にも産卵することがわかった。ノビエも好むので、本種の防除には水田内の除草も重要。 ・ 穎果内に産下された卵で越冬し、年4～5回発生する。 ・ 小型種であるため、稲の登熟初期には頂部の開口部から、中～後期には内穎と外穎の間の隙間（特に割れ粳）からしか吸汁できない。
アカスジカスミカメ		


粒剤を水田にまいて斑点米を減らす！



ホクコー

スタークル 粒剤


出穂後7～10日の間に、田面を湛水状態(3cm程度)にし、水口および水尻を止めて、スタークル粒剤を均一に散布してください。
散布後4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないでください。



適用内容および使用方法					
作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネドロオイムシ ニカメイチュウ	3kg /10a	収穫 7日前 まで	3回 以内	散布

※斑点米カメムシ防除は、畦畔の除草も大事です！

出穂10日前頃までに
畦畔の除草をしましょう!!



- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋はほ場などに放置せず適切に処理してください。
- 防除日誌を記載しましょう。

斑点米カメムシ防除に

らくらく散布の

クミアイ

スタークル 豆つぶ

田んぼに入らなくてもいいんです。
出穂7～10日後が散布適期です。

水を張って投込むだけ。
散布後「速い・長い」効果が期待できます。


■適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	シノテフランを含む 農薬の総使用回数
稲	カメムシ類	250g	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(育苗箱への処理及び単条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	250～500g				

粒剤 3kg ◆当用価格／3,670円 ◆引取り価格／3,350円 ◆配達価格／3,400円
豆つぶ ◆当用価格／3,920円 ◆引取り価格／3,550円 ◆配達価格／3,600円

いもち病、カメムシ類防除と
登熟歩合向上による高品質米の生産に！

フジワンラップ 粒剤



フジワン 粒剤 には

高温登熟下における白未熟粒の発生軽減

の登録があります



- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空袋等は、圃場などに放置せず、適切に処理してください。



明日の
農業を
考える

◆当用価格／4,230円 ◆引取り価格／3,950円 ◆配達価格／4,000円

令和3年用 水稲肥料農薬予約価格表・摘要

申込期日／令和2年12月25日
代金決済日／令和3年9月15日

安価な『引取り』でのご注文をお奨めいたします。
※引取り日・引取場所については別途ご連絡させていただきます。

商品に関するお問い合わせがございましたら、各営農センターへご連絡下さい。
営農経済渉外担当者が直接お伺いさせていただきます。

区分	No.	品名	容量 (kg)	成分			摘要	当用価格	引取り 価格	配達 価格
				チッソ	リンサン	カリ				
元肥 (白未熟粒一発減)	1	おすすめ商品 エムコート022	20	20	12	12	従来の元肥(エムコート824)と比べて 追肥成分 を10%多くした元肥	4,000	3,500	3,550
	2	セラコートR822	20	18	12	12	従来の元肥(セラコートR845)と比べて 追肥成分 を15%多くした元肥	3,700	3,450	3,500
元肥 一発減	3	エムコート824	20	18	12	14	コシヒカリ用 100日タイプ ミネラスと元肥一発の相乗効果で 食味と登熟も向上!!	4,450	4,050	4,100
	4	エムコート489 (早生用)	20	24	8	9	あきたこまち・みえのえみ用 80日タイプ	3,600	3,350	3,400
	5	セラコートR2500 (中晩生用)	20	25	10	10	みえのゆめ用 130日タイプ	3,900	3,600	3,650
	6	おすすめ商品 稲侍一発エムコート2877	15	28	7	7	コシヒカリ用 100日タイプ 高窒素成分で労力軽減 らくだ君に替わる15kgタイプ	3,250	2,950	3,000
元肥	7	津安芸水稲化成222	20	12	12	12	水稲の元肥に適した化成肥料	2,800	2,550	2,600
	8	銘柄集約商品 水稲元肥化成284	20	12	18	14		1,850	1,650	1,700
	9	銘柄集約商品 高度化成444	20	14	14	14	低コスト化成肥料 畑作にも最適 ※500袋単位で購入の場合は、 1,200円/袋で販売します	1,450	1,250	1,300
元肥 環境保全型	10	新登場 マイルドSBコシ専用200	20	20	10	10	硫黄被覆肥料 ですので、土壌微生物 の分解により圃場に殻が残らない環境 保全型の元肥一発肥料です。	3,900	3,600	3,650
有機肥料	11	有機アグレット674	20	6	7	4	有機100% 元肥 有機栽培に最適	3,200	3,000	3,050
	12	有機ブリケット038	20	10	3	8	有機80% 追肥 有機栽培に最適	3,200	3,000	3,050
追肥	13	銘柄集約商品 N K 化成7号	20	17	0	17	水稲追肥に適した化成肥料	1,800	1,550	1,600
育苗	14	育苗配合	3	8	12	8	育苗用(1袋で約150箱) ※自家採取の土に使用ください。	660	600	630
品質向上	15	ファイト・アップ (発泡型投込み剤)	10錠	3	10		出穂30~45日前頃に10a当り 10錠(1袋)散布 根張り・食味・歩留り向上	3,560	3,430	
	16	おすすめ商品 珪酸加里(ケイ酸34%)	20	品質向上資材		20	田植え後30日~45日頃に10a当り 20~40kg散布 珪酸補給で倒伏防止・収量増量	2,800	2,550	2,600
	17	FTEミネラス	3	登熟向上資材			出穂30日前頃に10a当り 2袋散布 ミネラス補給で食味向上	1,220	1,120	1,150
単肥	18	大粒硫安	20	21				1,350	1,250	1,300
	19	過磷酸石灰粒	20		17.5			1,800	1,650	1,700
	20	塩化加里粉	20			60		1,900	1,800	1,850

区分	No.	品名	容量 (kg)	成分			摘要	当用価格	引取り 価格	配達 価格
				チッソ	リンサン	カリ				
園芸用肥料	21	銘柄集約商品 化成8号	20	8	8	8	安価な低度化成	1,500	1,350	1,400
	22	銘柄集約商品 苦土入園芸化成682	20	16	8	12	苦土・ぼう素入りの園芸向け高度化成	2,000	1,750	1,800
	23	野菜有機ペレット057	20	10	5	7	有機52%入り	2,550	2,350	2,400

ジャンボタニシ対策資材

※詳しい防除方法は、P3~4のジャンボタニシ対策こよみをご覧ください。

区分	No.	品名	容量 (kg)	成分			摘要	当用価格	引取り 価格	配達 価格
				チッソ	リンサン	カリ				
改土良材	24	国産石灰窒素粒	20	20			20~30kg/10a 水稲収穫後及び田植え前 水温15℃以上の時に灌水散布(3~4日放置) ※田植え前は、元肥の量を調整する必要あり	3,650	3,400	3,450

区分	No.	品名	容量 (kg)	摘要		当用価格	引取り 価格	配達 価格
殺虫剤	46	スクミノン	2	1~4kg/10a	2回以内	3,260	2,860	
	47		8	田植え後2~3週間の間で散布	収穫60日前まで	12,000	10,400	
	48	スクミンベイト3	2	2~4kg/10a	田植え後2~3週間の間で散布 天然由来成分で環境にやさしく散布回数の制限はありません	3,110	2,710	

雑草イネ対策資材

新提案

※3品目セット購入をお願いします。詳しい防除方法は、P2の雑草イネ対策こよみをご覧ください。

区分	No.	品名	容量	使用量	摘要	当用価格	引取り 価格	配達 価格
体系処理剤	49	メテオジャンボ	300g	300g/10a	田植直後に散布 ヒエ剤(ベントキサゾン)が効く	1,850	1,570	1,650
	19	※ウィナーLジャンボ	500g	500g/10a	田植7日~10日後に散布 ヒエ剤(イブフェンカルバゾン)が効く	3,820	3,170	3,250
	20		1.5kg			10,490	9,200	9,450
	50	カイリキZジャンボ	300g	300g/10a	田植14日~20日後に散布 ヒエ剤(イブフェンカルバゾン)が効く	4,200	3,420	3,500
	51		900g			1,2000	9,950	10,200

※ウィナーLジャンボは、P26にも掲載しておりますので、注文の重複に気を付けてください。

※本書(令和3年用水稲肥料農薬予約申込書)に掲載しております商品価格は、消費税率10%を含めた金額となっております。

※令和3年用水稲肥料農薬予約申込書(提出用)はP27にあります。

区分	No.	品名	容量	使用量	摘 要	当用価格	引取り 価 格	配達 価格	
体系 系 処 理 剤	箱消毒	1	イチバン	500ml	500～1000倍	育苗箱の消毒 薬液へさっと浸漬させる。	2,190	2,000	2,030
	種子消毒	2	テクリードCフロアブル	100ml	200倍液で 24時間種子浸漬	種子消毒（ばか苗病・ごま葉枯病・もみ枯細菌病・ 苗立枯病・いもち病等）	740	680	710
		3	モミガードCドライフロアブル	100g	200倍液で 24時間種子浸漬	種子消毒（ばか苗病・ ごま葉枯病 ・もみ枯細菌病・苗立枯れ病・いもち病） 『みえのゆめ』はごま葉枯病が出やすいので必ず使用ください!!	790	700	730
	殺虫	4	スミチオン乳剤	100ml	1000倍液で 24時間種子浸漬	種子消毒（イネシンガレセンチュウ）	460	390	410
	殺菌	5	タチガレエースM粉剤	1kg	1箱当り 6～8g	苗立枯れ病 播種前の土壌に均一に混和	1,480	1,370	1,400
		6	タチガレエースM液剤	100ml	1000倍液で 1箱当り500ml	苗立枯れ病 播種時または発芽後に散布	970	890	920
	菌	7	おすすめ商品 ナエファインフロアブル	100ml	1000～2000倍液で 1箱当り500ml	苗立枯れ病 播種時または発芽後に散布 ★タチガレエースでは防除できない「リゾーブス菌」 に効く	1,900	1,770	1,800
		8	フジワン粒剤	3kg	1箱当り 15g	ムレ苗防止・健苗育成 緑化始期に均一に散布	2,390	2,100	2,130
育苗箱施用	殺虫・殺菌	9	新登場 おすすめ商品 デジタルメガフレア箱粒剤	1kg	1箱当り 50g	いもち病・ 小型カメムシ ・ウンカ類・ニカメイチュウ イネミズゾウムシ・イネドロオイムシ等 移植前3日～移植当日までに散布	5,100	4,350	4,400
	10	ツインターボ箱粒剤	1kg	1箱当り 50g	いもち病・内穎褐変病・ウンカ類 イネミズゾウムシ・イネドロオイムシ 播種時（覆土前）～移植当日までに散布 播種同時処理可能	3,720	3,250	3,300	
	11	新登場 おすすめ商品 ブーンレパード箱粒剤	1kg	1箱当り 50g	いもち病・ 紋枯病 イネミズゾウムシ・イネドロオイムシ等 播種時（覆土前）～移植当日までに散布 播種同時処理可能	4,600	3,900	3,950	
初中期一 発 処 理 除 草 剤	12	新登場 20周年特価 トップガンRフロアブル	500ml	500ml/10a	移植時～ ノビエ2.5葉期まで 田植同時散布機での移植時散布可能 発売20周年を迎えた「トップガン」が進化！ベンスルフロンメチル含有量を増加で除草効果を安定化	3,600	2,770	2,850	
	13	おすすめ商品 エンペラー1キロ粒剤	1kg	1kg/10a	移植時～ ノビエ3葉期まで 新規成分「エフィーダ」でホタルイ、オモダカなどに効果大 ☆田植同時散布機での移植時散布可能	3,550	3,070	3,150	
	14	おすすめ商品 エンペラージャンボ	250g	250g/10a	移植直後～ ノビエ3葉期まで 労力軽減のジャンボ剤 新規成分「エフィーダ」でホタルイ、オモダカなどに効果大	3,650	3,120	3,200	
	15		750g		お得な30a規格	10,600	9,100	9,350	
	16	おすすめ商品 カウンスルエナジージャンボ	400g	400g/10a	アゼから侵入する雑草対策に！ (キシュウスズメノヒエ・イボクサ等) 労力軽減のジャンボ剤	3,920	3,270	3,350	
	17		1.2kg		移植直後～ ノビエ3葉期まで 新規成分（トリアファモン） お得な30a規格	10,690	9,400	9,650	
	18	当JA売上No.1 ウィナー1キロ粒剤	1kg	1kg/10a	移植時～ ノビエ2.5葉期まで ヒエ剤(イプフェンカルバゾン)でノビエに長く効く！	3,620	2,970	3,050	
	19	当JA売上No.1 ウィナーLジャンボ	500g	500g/10a	移植直後～ ノビエ2.5葉期まで 労力軽減のジャンボ剤	3,820	3,170	3,250	
	20		1.5kg		ヒエ剤(イプフェンカルバゾン)でノビエに長く効く！ ホタルイへの効果で定評のあるプロモブチド配合！ お得な30a規格	10,490	9,200	9,450	
	21	特別価格 コメットジャンボ	300g	300g/10a	移植後5～20日まで（ノビエ2.5葉期まで） 労力軽減のジャンボ剤 コウキヤガラ10cm登録!!	3,670	2,920	3,000	
	22		900g		AVH-301＋アルテアにより各種広葉雑草・難防除雑草 に対して効果大 お得な30a規格	10,590	8,600	8,850	
	23	アルファアップロLジャンボ	250g	250g/10a	移植後3日～30日まで（ノビエ2.5葉期まで） 労力軽減のジャンボ剤	3,700	3,020	3,100	
24	750g			新規成分(フェノキサスルホン)によりノビエや一年生雑草(アゼナ・コナギ等)に 長期残効およびホタルイに安定した効果 お得な30a規格	10,200	8,750	9,000		

区分		No.	品 名	容 量	使用量	摘 要	当用価格	引取り 価 格	配達 価格
体 系 処 理 剤	初期 除草 剤	25	サ キ ド リ E W	500ml	500ml／10a	代かき時～移植前7日まで 移植直後～ ノビエ1葉期 ☆代かき時に同時散布可能(散布後7日間は田植えを行わない)	1,580	1,320	1,370
		26	おすすめ商品 ク ラ ー ル E W	500ml	500ml／10a	代かき後～移植前7日まで 移植直後～ ノビエ1.5葉期 藻類の発生を抑制する「ジメタメトリン」配合	1,480	1,270	1,320
		27	クラール1キロ粒剤	1kg	1kg／10a		1,320	1,170	1,220
	中期 除草 剤	28	ニトウリュウジャンボ	500g	500g／10a	移植後15日～ノビエ4葉期まで 初期剤との体系処理で移植後20日～30日が効果的	3,900	3,170	3,250
		29	新登場 おすすめ商品 シアゲMF1キロ粒剤	1kg	1kg／10a	移植後20日～ ノビエ4.5葉期(収穫60日前まで) 初期剤との体系処理で抵抗性ホタルイ・クログワイ 等の難防除雑草に効果大	3,600	2,920	3,000
中 ・ 後 期 除 草 剤		30	おすすめ商品 レプラスジャンボ	400g	400g／10a	移植後14日～ノビエ4葉期(収穫60日前まで) ノビエ・抵抗性ホタルイ・クログワイをはじめとする 幅広い草種に効果の高い4成分中期剤	4,280	3,850	3,930
		31	新登場 おすすめ商品 ロイアント乳剤	200ml	200ml／10a 500倍 希釈水量100ℓ	移植後20日～ ノビエ5葉期(収穫45日前まで) すばやい効果発現、散布2時間後の雨でも効果を発揮 クサネム、イボクサ、コナギ等の大きな広葉雑草に効果大	3,560	3,020	3,100
		32	クリンチャー1キロ粒剤	1kg	1kg／10a	移植後25日～ノビエ5葉期(収穫30日前まで) ノビエ・キシュウスズメノヒエに効果大	1,730	1,520	1,600
		33	バサグラン粒剤	3kg	3～4kg／10a	移植後15～55日(収穫60日前まで) 落水(足跡水程度)散布 抵抗性ホタルイに効果あり(3.5葉期以降は効果薄)	3,310	2,920	3,000
水 稲 防 除 剤	殺 菌	34	キ タ ジ ン P 粒 剤	3kg	3kg／10a	いもち病・紋枯病予防 ジャンボタニシに対して10a当り5kg散布(発生初期)	2,020	1,830	1,880
		35	コ ラ ト ッ プ 粒 剤	3kg	3～4kg／10a	いもち病予防・初発防除 穂いもちに対しては出穂30～5日前までに散布 葉いもちには長い残効で高い効果	2,550	2,130	2,180
		36	コラトップジャンボP	500g	500g／10a	いもち病予防・初発防除 穂いもちに対しては出穂30～5日前までに散布 労力軽減のジャンボ剤	3,460	3,100	3,150
	殺 虫	37	ス タ ー ク ル 粒 剤	3kg	3kg／10a	カメムシ類・ウンカ類・ニカメイチュウ等 出穂後7～10日の間に散布(収穫7日前まで)	3,670	3,350	3,400
		38	スタークル豆つぶ	250g	250g／10a	カメムシ類・ウンカ類 出穂後7～10日の間に散布(収穫7日前まで) 豆まき感覚で労力軽減	3,920	3,550	3,600
	殺 虫 ・ 殺 菌	39	ダブルカットスタークル粉剤DL	3kg	3～4kg／10a	カメムシ類・ウンカ類、いもち病等 (穂揃い期まで) カメムシ防除の定番スタークル+いもち病(予防+治療)	2,240	2,010	2,060
		40	フジワンラップ粒剤	3kg	3～4kg／10a	カメムシ類、ウンカ類・いもち病防除+登熟歩合向上 散布適期：出穂10日～15日前(収穫30日前まで) 1剤で斑点米カメムシ類といもち病を同時防除	4,230	3,950	4,000
	園 芸 用 農 薬		41		1L	根まで枯らす除草剤	3,720	3,200	3,400
42			ラウンドアップマックスロード	2L	JA独自の お得な規格	1L当り 2,675円(引取り価格)	5,910	5,350	5,740
43				5.5L		1L当り 約1,854円(引取り価格)	11,410	10,200	10,660
農 薬		44	ザ ク サ 液 剤	500ml	主に地上部を枯らす除草剤 頑固なスギナも100倍で枯らします。 水田畦畔を崩さない!!	2,200	2,010	2,060	
		45	ジェイエース粒剤	1kg	殺虫剤(アオムシ・ヨトウムシ・アブラムシ等) ☆JA独自の安価な殺虫剤	760	680	710	

網掛けの商品については経済的な大型規格品がご用意しております。
※本書（令和3年用水稲肥料農薬予約申込書）に掲載してあります商品価格は、消費税率10%を含めた金額になっております。
※市況の変動により記載価格が変更になる場合がありますのでご了承ください。
※令和3年用水稲肥料農薬予約申込書（提出用）はP27にあります。

こんなときこそ
「がんばろう」
こんなときでも
「負けるな農業」
どんなときも
私たちは
がんばる
農家のみなさまを
応援します。

J A 津安芸

令和3年用 水稻肥料農薬申込書 (提出用)



申込期日／令和2年12月25日
代金決済日／令和3年9月15日

氏 名	電話 番 号	組合員コード	令和2年度水田面積	作付予定面積
様			a	a

【肥料】 申込予約No. 06301 06302 申 込 数 量 06303 06304

【農薬】 申込予約No. 06303 06304

※引取日・引取場所については別途ご連絡させていただきます。

【肥料】			申込予約No.		06301		06302		
区分	品 名	容量 (kg)	成 分		申 込 数 量		配 達 価 格	配 込 達	
			チッソ	リンサン	カリ	No.			引取価格
元 肥	おすすめ エムコート022	20	20	12	12	1	3,500	1	3,550
	セラコートR822	20	18	12	12	2	3,450	2	3,500
	エムコート824	20	18	12	14	3	4,050	3	4,100
	エムコート489(早生用)	20	24	8	9	4	3,350	4	3,400
	セラコートR2500(中晩生用)	20	25	10	10	5	3,600	5	3,650
元 肥	おすすめ 稲待一発エムコート2877	15	28	7	7	6	2,950	6	3,000
	津安芸水稻化成222	20	12	12	12	7	2,550	7	2,600
	銘柄集約 水稻元肥化成284	20	12	18	14	8	1,650	8	1,700
	銘柄集約 高度化成444	20	14	14	14	9	1,250	9	1,300
	新登場 マイルドSBコシ専用200	20	20	10	10	10	3,600	10	3,650
有 機	有機アグレット674	20	6	7	4	11	3,000	11	3,050
	有機ブリケット038	20	10	3	8	12	3,000	12	3,050
	銘柄集約 NK化成7号	20	17	0	17	13	1,550	13	1,600
	育苗 配合	3	8	12	8	14	600	14	630
	ファイトアップ(発泡型投込み剤)	10錠	3	10		15	3,430	15	3,430
品質向上	おすすめ 珪酸加里(ケイ酸34%)	20	品質向上資材		20	16	2,550	16	2,600
	F T E ミ ネ ラ ス	3	登熟向上資材			17	1,120	17	1,150
	大 粒 硫 安	20	21			18	1,250	18	1,300
	過 燐 酸 石 灰 粒	20		17.5		19	1,650	19	1,700
	塩 化 加 里 粉	20			60	20	1,800	20	1,850
園芸用肥料	銘柄集約 化成8号	20	8	8	8	21	1,350	21	1,400
	銘柄集約 苦土入園芸化成682	20	16	8	12	22	1,750	22	1,800
	野菜有機ペレット057	20	10	5	7	23	2,350	23	2,400

【ジャンボタニシ対策資材】				申込予約 No.		06301		06302			
区分	品 名	容量 (kg)	成 分		申 込 数 量						
			チッソ	リンサン	カリ	No.	引取価格	引取り	No.	配達価格	配達
土改材	国産石灰窒素 粒	20	20			24	3,400		24	3,450	
			申込予約 No.		06303		06304				
殺 虫 剤	ス ク ミ ノ ン	2					46	2,860		46	2,860
		8					47	10,400		47	10,400
	ス ク ミ ノ ン ベ イ ト 3	2	48	2,710		48	2,710				
【雑草イネ対策資材】 新提案				申込予約 No.		06303		06304			
体 系 処 理 剤	メ テ オ ジ ャ ン ボ ウィナー-L ジャンボ カイリキZ ジャンボ	300g					49	1,570		49	1,650
		500g					19	3,170		19	3,250
		1.5kg					20	9,200		20	9,450
		300g					50	3,420		50	3,500
		900g					51	9,950		51	10,200

※ウィナールジャンボは、【農薬】にも申込数量欄がございますので、注文の重複に気を付けてください。

※価格と摘要についてはP25～26を参照ください。

※組合員コードについてはJAで記入をいたしますので記入しないでください。

※指定日にJAへ引取りに来ていただける方は『引取り』の欄へ数量を記入ください。引取りの場合、価格がお安くなっております!!

※お問合せはお近くの営農センターへお願いします。

☆注文書以外で希望商品がありまして下記欄外へ記入をしてください。

欄 外 注 文	商 品 名		規 格	数 量
注 文				

予約注文書の利用目的

ご記入いただきました個人情報、商品の発送、代金の請求・決済などの他、当組合の提供する商品・サービスに関する各種情報に利用し、情報の管理については適切かつ厳重におこないます。

【肥 料】 申込予約No. 06301 06302 申 込 数 量 申 込 数 量 06303 06304

【農 薬】 申込予約No. 06303 06304

※引取日・引取場所については別途ご連絡させていただきます。

区分	品 名	容量 (kg)	成 分		申 込 数 量	
			チッソ	リンサン	No. 引取価格 引取り	No. 配達価格 配達
元 肥	エムコート022	20	20	12	12	1 3,500
	セラコートR822	20	18	12	12	2 3,450
	エムコート824	20	18	12	14	3 4,100
	エムコート489(早生用)	20	24	8	9	4 3,400
	セラコートR2500(中晩生用)	20	25	10	10	5 3,600
元 肥	稲待一発エムコート2877	15	28	7	7	6 2,950
	津安芸水稻化成222	20	12	12	12	7 2,600
	銘柄集約 水稻元肥化成284	20	12	18	14	8 1,650
	銘柄集約 高度化成444	20	14	14	14	9 1,250
	元肥一発 マイルドSBコシ専用200	20	20	10	10	10 3,600
有 機	有機アグレット674	20	6	7	4	11 3,000
	有機ブリケット038	20	10	3	8	12 3,000
	追肥 銘柄集約 NK化成7号	20	17	0	17	13 1,550
	育苗 育苗配合3	3	8	12	8	14 600
	品質向上 ファイト・アップ(発泡型投込み剤)	10錠	3	10	15	15 3,430
単 肥	おすすすめ 珪酸加里(ケイ酸34%)	20	品質向上資材		20	16 2,550
	F T E ミ ネ ラ ス	3	登熟向上資材		17	17 1,120
	大 粒 硫 安	20	21		18	18 1,250
	過 燐 酸 石 灰	20		17.5	19	19 1,650
	塩 化 加 里 粉	20		60	20	20 1,800
園 芸 用 肥 料	銘柄集約 化成8号	20	8	8	8	21 1,350
	銘柄集約 苦土入園芸化成682	20	16	8	12	22 1,750
	野菜有機ペレット057	20	10	5	7	23 2,350

【ジャンボタニシ対策資材】					申込予約 No.		06301		06302		
区分	品 名	容量 (kg)	成 分		申 込 数 量						
			チッソ	リンサン	カリ	No.	引取価格	引取り	No.	配達価格	配込達
土改材	国産石灰窒素 粒	20	20			24	3,400		24	3,450	
	申込予約 No. 06303 06304										
殺 虫 剤	ス ク ミ ノ ン	2					46	2,860		46	2,860
		8					47	10,400		47	10,400
	ス ク ミ ン ベ イ ト 3	2					48	2,710		48	2,710

体 系 処 理 剤	品 名	容量 (kg)	成 分		申 込 数 量	
			チッソ	リンサン	No. 引取価格 引取り	No. 配達価格 配達
殺 虫 剤	メテオジャンボ	300g			49 1,570	49 1,650
	ウィナーLジャンボ	500g			19 3,170	19 3,250
		1.5kg			20 9,200	20 9,450
		300g			50 3,420	50 3,500
	カイリキZジャンボ	900g			51 9,950	51 10,200

※ウィナーLジャンボは、【農薬】にも申込数量欄がございますので、注文の重複に気を付けてください。

※価格と摘要についてはP25～26を参照ください。

※組合員コードについてはJAで記入をいたしますので記入しないでください。

※指定日にJAへ引取りに来ていただける方は『引取り』の欄へ数量を記入ください。引取りの場合、価格がお安くなっております!!

※お問合せはお近くの営農センターへお願いします。

☆注文書以外で希望商品がありましてら下記欄外へ記入をしてください。

欄外注文	商 品 名	規 格	数 量

予約注文書の利用目的

ご記入いただきました個人情報、商品の発送、代金の請求・決済などの他、当組合の提供する商品・サービスに関する各種情報に利用し、情報の管理については適切かつ厳重におこないます。