

いつもJA津安芸をご利用頂きありがとうございます。
JA津安芸管内の農業情報や農業を営む担い手の皆様に
少しでも役に立つ情報をお届けさせていただきます。

一番多く作付されているコシヒカリは栽培が難しい!?

【多く作られている理由】

- ①食味が極めて良い
- ②比較的どこの地域でも作れる

【栽培の難しい理由】

- ①いもち病に弱い
- ②倒伏しやすい
(収量が減る・品質低下)

◆三重県の主なうるち米の品種特性を紹介します◆



重宝	うるち	品種名	播種期	田植期	出穂期	成熟期	稈長(cm)	穂長(cm)	穂数(本/m)	玄米千粒重(g)	諸抵抗性				耐倒伏性	その他特性等
											葉いもち	穂いもち	白葉枯病	紋枯病		
うるち	早生	あきたこまち	4/4	4/25	7/12	8/15	79	18.9	432	22.2	中	中	中	中	中	良食味。収量性がやや低い。
		みえのえみ	4/4	4/25	7/15	8/16	75	19.5	459	21.9	中	やや強	中	やや弱	強	極良質、良食味、耐倒伏性優れる。
		コシヒカリ	4/4	4/25	7/19	8/23	87	20.1	421	21.8	弱	弱	中	中	弱	極良食味。耐倒伏性劣る。
		キヌヒカリ	4/4	4/25	7/20	8/22	75	19.1	392	22.1	中	中	中	中	強	良質、良食味、耐倒伏性優れる。 穂発芽が発生しやすい。
		どんとこい	4/4	4/25	7/21	8/26	68	18.6	401	21.9	やや強	やや強	やや強	中	強	良質、良食味、耐倒伏性優れる。 穂発芽が発生しやすい。
		三重23号	4/4	4/25	7/13	8/14	77	20.5	435	23.7	中	やや強	中	中	やや強	極良食味、耐倒伏性強、 耐高温登熟成強。
	中生	みえのゆめ	4/25	5/16	8/7	9/10	72	20.0	350	23.7	強	強	弱	中	強	良質、極良食味、胴割れしにくい。 耐倒伏性に優れる。ごま葉枯病に弱い。