

いつもJA津安芸をご利用頂きありがとうございます。
JA津安芸管内の農業情報や農業を営む担い手の皆様に
少しでも役に立つ情報をお届けさせていただきます。



いもち病の早期発見！早期防除！ フラスタムの活用で流行ストップ！！

三重県病害虫防除所

★いもち病発生予想支援システム (フラスタム)

いもち病発生予想支援システム（フラスタム）では、気象庁のアメダスのデータを利用して、いもち病の発生時期を地域ごとに予測しています。

いもち病菌の感染好適条件が揃った場合、揃った日に「●」の印で示されます。

「●」印がある日から7日～10日後に葉いもち病の病斑が現れます。

右の一例のように、感染好適条件が繰り返して出現した場合は、いもち病が流行してしまい、特に注意が必要です。

情報を取り入れて早期発見・早期防除に取り組みましょう。

いもち病発生予測支援システム・フラスタムの一例

1993	桑名	四日市	亀山	津	上野	羽見	小浜	南伊勢	紀伊長島	尾鷲
6/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6/30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7/08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

凡例 ●:いもち病菌の感染に好適な気象条件(感染好適条件)であったことを示す。
この日から7～10日後に葉いもちの病斑が現れることが予測される。

三重県病害虫防除所

三重県病害虫防除所 フラスタム

検索

詳しくはこちらから閲覧できます。

<http://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/89860000001.htm>

いもち病菌の感染好適条件

- 平均気温15℃～25℃
- 湿潤時間10時間以上
- 当日を含めて前5日間の平均気温が20℃～25℃



発生2～3日後の病斑

いもち病の発生が出やすくなるのは???

- ・日照条件が悪い所
- ・風通しの悪い所
- ・多肥料でイネの葉色が濃い
- ・前年多発圃場に多い

(菌の付着した籾やワラ・補植用の置き苗が伝染源になる)

いもち病に弱い品種
コシヒカリ・あきたわら

毎年、いもち病で

困っている方は注意!!



予防

葉いもち病が初発段階では、
予防的に粒剤が効果的!!



コラトップ粒剤 3kg (2,500円)
簡単に散布できるジャンボもあります。(ジャンボ剤500g 3,400円)

治療

発生が目立つ場合には、
治療効果の高い液剤・粉剤を!!



- ・ブラシン粉DL 3kg (1,280円)
- ・ブラシンフロアブル 500ml (2,300円)
- ・ダブルカットフロアブル 500ml (1,800円)