

いつもJA津安芸をご利用頂きありがとうございます。
JA津安芸管内の農業情報や農業を営む担い手の皆様に
少しでも役に立つ情報をお届けさせていただきます。



畦畔雑草対策！カソロン4.5粒剤！ 冬に散布し田植え前までの雑草退治！！

カソロン粒剤の特長

- 雑草種子の発芽を抑制し、長期間にわたって雑草の発生を抑えます。
- 土壌処理剤で根まで枯らさないの、土手が大きく崩れる心配がありません。
- 粒剤で使用しやすくドリフトの心配がない。
- スギナに特に良く効きます。

★キャンペーン期間
12月29日まで
5kg 3600円(税込)



三重県版 カソロン粒剤の適切な散布時期・散布量

カソロン粒剤は、気温が高いと除草成分が早く気化してしまい、長い効果が期待できません。
そのため、平均気温12℃以下になる時期に散布することが大切になります。

三重県では、12月から1月末頃が散布のおススメです。

- 5kg（カソロン1袋）で散布できる距離は？

あぜ幅 1mの場合 **625m** 散布できます！

あぜ幅 1.5mの場合 **416m** 散布OK！

散布目安は
1㎡=8g

あぜ幅にあわせて
散布して下さい。

散布のポイント

《均一に散布》


カソロン粒剤は、土壌吸着性が高いため丁寧にムラなく散布しましょう。
偏った散布になると効果にもムラができます。均一に散布するために、専用散布機『粒剤スプレーヤー』があります。

《早めに散布》

雑草の発生はじめに散布。雑草が大きすぎると枯れにくい。

《降雨の前後がおススメ》

降雨あとに散布するなど、雨や朝露で土が湿っている時に散布してください。



注意点

- 水田の中に飛ばないように散布する！
散布は畦畔だけ！！
- 効かない雑草もあります。
シロツメクサ（クローバー）・カラスノエンドウなど

