

いつもJA津安芸をご利用頂きありがとうございます。
JA津安芸管内の農業情報や農業を営む担い手の皆様に
少しでも役に立つ情報をお届けさせていただきます。

いもち病に注意！！ 6月9日と11日に感染好適条件が揃っています。

いもち病発生予想支援システム！最新情報！（6月15日時点）

三重県病害虫防除所のいもち病発生予想支援システムでは、6月9日と6月11日にいもち病の感染好適条件が揃いました。いもち病菌の感染好適条件が揃った日から7日～10日後に葉いもち病の病斑が現れます。早期に発見し早期防除に努めましょう！！

平成30年	桑名	四日市	亀山	津	上野	粥見	小俣	南伊勢	鳥羽	紀伊長島	尾鷲	熊野新鹿	新宮
6/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/07	●	-	-	-	◎	◎	-	●	◎	●	●	-	●
6/08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/09	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
6/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/11	-	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-
6/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

三重県病害虫防除所 プラスタム

詳しくはこちらから閲覧できます。
<http://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/89860000001.htm>

いもち病菌の感染好適条件が揃った場合は、『●』の印で示されます。

『●』の印がある日から7日～10日後に病斑が現れ、葉いもちの流行する前段階

『●』の印が約1週間おきに感染好適条件が繰り返して出現すると流行の開始・発病の増加へ繋がります。

いもち病の写真

情報を取り入れて
早期発見！
早期に防除！



いもち病の発生が出やすくなる条件は？？？

- ・日照条件が悪い所
 - ・風通しの悪い所
 - ・多肥料でイネの葉色が濃い
 - ・前年多発圃場に多い
- （菌の付着した粃やワラ・補植用の置き苗が伝染源になる）

予防

葉いもち病が初発段階では、予防的に粒剤が効果的！！



コラトップ粒剤 3kg (2,500円)
簡単に散布できるジャンボもあります。（ジャンボ剤500g 3,400円）

治療

発生が目立つ場合には、治療効果の高い液剤・粉剤を！！



- ・ブラシン粉DL 3kg (1,280円)
- ・ブラシンフロアブル 500ml (2,300円)
- ・ダブルカットフロアブル 500ml (1,800円)