

いつもJA津安芸をご利用頂きありがとうございます。
JA津安芸管内の農業情報や農業を営む担い手の皆様に
少しでも役に立つ情報をお届けさせていただきます。

中後期除草剤『レブラス』の散布は、 水のある時に！！

ある程度の雑草にも、
枯らす効果が高い！
これからの雑草に、
土壌処理効果で抑制！

中後期除草剤『レブラス』の使用回数は、1回です。
より効果的に使用するため、散布する時期を考えて雑草に応じて選択しましょう！

1回目の散布タイミング
☆中干し前の7日間まで

散布するタイミングの
どちらかを選択！

2回目の散布タイミング
★収穫60日前の登録ギリギリ散布

取りこぼした雑草には早めの散布！
これからの大型雑草に！

中干し期間

生え始めの大型雑草に！
これから出てくるとされる雑草予防に！

※レブラスの効果発現は、遅効的です。
3週間～1か月程度は、効果を待って下さい。

最近、多くなってきた大型雑草（広葉雑草3種類）



クサネム

クサネム(マメ科)

1年草。荒地や田のあぜなど多いが水田にも多く生えます。
水田に生えると、コンバイン刈取りの邪魔になったり、種子が米に混入して
品質を落とすことが問題になっています。
葉が特徴的な羽状複葉のため意外と、液剤でも枯れ残ることがあります。



アメリカミズキンバイ
(別名ヒレタゴボウ)

ヒレタゴボウ(アカバナ科チョウジタデ属)

1年草。8月頃から黄色い花を咲かせます。
休耕田・水田のあぜや湿地などに生育します。
花は、黄色く一つずつ点々と咲きます。チョウジタデによく似てます。
花の大きさは、ヒレタゴボウ(大きい) > チョウジタデ(小さい)
草丈は、1メートルを超えます。



アメリカ
センダングサ

アメリカセンダングサ(キク科)

1年草。水辺や休耕田などに普通に生育するが、水田にも生えます。
キク科雑草のため、葉がギザギザしています。
草丈は、1メートル以上になります。

水がない場合は、落水散布ができる除草剤を選択しましょう！



【落水散布の注意点】

- ①散布直後の降雨に注意しよう。※天気予報を活用して、晴れ間が続く時に散布
- ②規定量をたっぷり雑草にかかるように散布する。
- ③生えている雑草は枯らす、その後生えてくる雑草には効果がありません。